

Hur används Intrarosa?

Intrarosa är ett litet (längd 28 mm) långsmalt vagitorium som förs in i slidan med ett finger eller med applikatorn som medföljer i förpackningen. I bipacksedeln finns en detaljerad anvisning för hur Intrarosa används. Vanlig dosering är ett vagitorium dagligen, vid sänggåendet. Följ alltid din läkares anvisningar.

Anteckningar

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Intrarosa orsaka biverkningar. Intrarosa vagitorium innehåller hårdfett som smälter då vagitoriet förs in i slidan. Behandlingen i sig hjälper även till att ge mer fuktighet i underlivet. Den vanligaste biverkningen i kliniska prövningar var flytningar från slidan. Du behöver inte sluta använda Intrarosa på grund av detta.

För mer information om klimakteriet, se Vårdguiden (1177.se)

 **Intrarosa®**
Prasteron 6,5 mg (DHEA)
vagitorium

PATIENTINFORMATION

Till dig som blivit ordinerad behandling med Intrarosa



Bilden på förpackning, vagitorium och applikator
visas inte i sin verkliga storlek

AVIA PHARMA

www.aviapharma.se

AVIA-IR-2026-AUG-003

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED INTRAROSA

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED INTRAROSA

Om klimakteriet

Klimakteriet, eller övergångsåldern, är en naturlig fas i alla kvinnors liv, som innebär att hormonbalansen i kroppen förändras. **Alla upplever klimakteriet individuellt, men ungefär 7 av 10 kvinnor i övergångsåldern upplever besvär som kan påverka livskvaliteten negativt.**

Många kvinnor upplever en kombination av besvär såsom:

- oregelbundna blödningar
- värmevallningar och plötsliga svettningar
- sömnproblem
- humörsvängningar
- besvär med torra slemhinnor, sveda och klåda i underlivet
- urinvägsbesvär såsom att du ofta känner dig kissnödig och det kan läcka urin då du hostar eller nyser, upprepade urinvägsinfektioner
- minskad sexlust och smärta vid samlag

Vilken eventuell behandling som behövs är individuellt. En del av symtomen vid klimakteriet avtar med åren. Undantaget är besvär från underlivet som, om obehandlade, kan tillta med åren.

Torra och sköra slemhinnor

Under klimakteriet blir vävnaderna i slidan och urinvägarna både tunnare och torrare vilket kan orsaka klåda, sveda och smärta vid samlag. Detta orsakas bl.a. av att kroppens produktion av östrogen minskar. Ungefär hälften av alla kvinnor besväras av torra och sköra slemhinnor och besvär relaterat till detta.

Behandling med läkemedel som appliceras direkt i slidan, har effekt lokalt på de sköra slemhinnorna i vagina i och med att läkemedlet frisätts och utövar sin effekt där det behövs. Det är viktigt att komma ihåg att problem med torra slemhinnor inte förbättras med åren, utan snarare kan tillta om det inte behandlas.



Klåda



Torrhet



Brännande
känsla / sveda



Smärta vid
samlag

Vad är Intrarosa?

Intrarosa är ett läkemedel som används av kvinnor efter klimakteriet, som har måttliga till svåra symtom med torra och sköra slemhinnor, så kallad atrofi, i underlivet. Det används för att lindra symtom såsom torrhet, irritation och smärta vid samlag. Intrarosa förs in i slidan och frisätts därmed precis där det behövs.

Den verksamma substansen i Intrarosa heter prasteron eller DHEA (dehydroepiandrosteron) och är inte aktivt innan det har tagits upp i vaginan. I vaginans celler ombildas DHEA till östrogen och testosteron.

Ta alltid del av informationen i bipacksedeln.